


PROGRAM OCHRONY STAD DROBIU PRZED SALMONELLĄ[®]



NAJLEPSZA DEZYNFEKCJA



VIRON P



ECO-STERIL PLUS



FAM 30

DDD-1[®]
NAJLEPSZA DEZYNFEKCJA



NAJLEPSZA DEZYNFEKCJA

PREPARATY DO DEZYNFEKCJI ŚCIOŁKI oraz RUSZTÓW w HODOWLI PTAKÓW


ECO-STERIL PLUS Sucha dezynfekcja ściółki w trakcie cyklu produkcyjnego. Do stosowania w obecności ptaków. Posiada właściwości dezynfekujące oraz osuszające. Hamuje wzrost patogenów chorobotwórczych w tym bakterii beztlenowych. Chroni przed Foot Pad Dermatitis łap (kontaktowe zapalenie skóry). Stosować w ilości 50-100g na m² ściółki co 7-10 dni lub 14 dni końcem cyklu..

VIRON P Preparat bakterio- i wirusobójczy. Przebadany w PIWET Puławy. Stosować do dezynfekcji ściółki w trakcie cyklu produkcyjnego, mat dezynfekcyjnych, środków transportu zwierząt oraz wszelkich miejsc przetrzymywania zwierząt. Stosować w stężeniu 0,5-1,0%. Dezynfekcję ściółki, ruszt przeprowadzać co 7-10 dni lub 14 dni przed końcem cyklu. Produkt bezpieczny, ulega rozkładowi, nie wykazuje bioakumulacji w środowisku.

FAM 30 Preparat bakterio-, grzybo- i wirusobójczy. Zawiera 2,84% aktywnego jodu. Stosować do dezynfekcji ściółki w trakcie cyklu produkcyjnego, mat dezynfekcyjnych, środków transportu zwierząt oraz wszelkich miejsc przetrzymywania zwierząt. Stosować w stężeniu 0,5-1,0%. Dezynfekcję ściółki, ruszt przeprowadzać co 7-10 dni lub 14 dni przed końcem cyklu. Produkt bezpieczny do stosowania w obecności zwierząt, ulega rozkładowi, ulega biodegradacji.

DDD-1®

ul. Hałcnowska 19; 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33-821-34-21



ECO-STERIL PLUS

SUCHA ŚCIÓŁKA

- skuteczna dezynfekcja na sucho

www.DezynfekcjaŚciółki.pl

Preparat przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt oraz pomieszczeń dla ludzi, dezynfekcji środków transportu dla zwierząt oraz środków produkcji i transportu zbóż, pasz i surowców paszowych.

SKŁAD:

Substancja czynna – Chloramina T- Tosylochloramid sodu
0,25g/100g (0,25% wagowo)

NR POZWOLENIA: 6727/16

POSTAĆ PRODUKTU: proszek

WSKAZANIA: *Eco-Steril Plus* powinien być stosowany do:

- 1) Dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich dla zwierząt w szczególności bydła, trzody, drobiu, gołębi, królików, zwierząt domowych
- 2) Dezynfekcji miejsc czasowego pobytu zwierząt: np. spędy, wystawy, targi, zawody.
- 3) Dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz, surowców paszowych itp.
- 4) Dezynfekcji pomieszczeń czasowego pobytu ludzi (sanitariaty, łazienki, prysznice, korytarze, klatki schodowe, itp.).

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym. Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt należy spłukać wodą pitną.

Eco-Steril Plus MOŻE BYĆ STOSOWANY W OBECNOŚCI ZWIERZĄT.

ZAKRES STOSOWANIA: *Eco-Steril Plus* stosuje się w dawce 50-100g na 1 m² rozsypując równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną (ściółka, piasek, maty, ruszty, wióry i inne powierzchnie w pomieszczeniach inwentarskich) jeden raz w tygodniu a w przypadku bydła mlecznego 2-3 razy w tygodniu.

Szczególną uwagę zwracać na miejsca występowania wilgoci, okolice poidel i miejsc podawania pokarmu. W czasie pierwszego zastosowania zaleca się kontynuowanie dezynfekcji przez 2-3 kolejne dni, a następnie raz w tygodniu. W przypadku wystąpienia infekcji częstotliwość stosowania zwiększyć.



W hodowli ściółkowej przed położeniem ściółki zaleca się zastosowanie dawki 100g na 1 m² podłoża. Następnie stosować wg. wcześniejszych zaleceń czyli 50-100g na 1 m² raz w tygodniu. Przy stosowaniu preparatu zwierząt nie trzeba wyprowadzać. Preparat nie wymaga żadnego okresu karencji - gdy stosowany w pustych pomieszczeniach, zwierzęta można wprowadzać od razu po zastosowaniu preparatu. Środki transportu dezynfekujemy stosując dawkę 50g na 1 m².

*Szczególnie zaleca się stosowanie **Eco-Steril Plus** do obsypywania prosiąt zaraz po urodzeniu, dezynfekcji kojców porodowych i przy odsadzeniach. Stosować do codziennej dezynfekcji pomieszczeń dla cieląt.*

*Zaleca się stosowanie **Eco-Steril Plus** do suchej dezynfekcji racic i kopyt.*

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: Nie stwierdzono działań ubocznych szkodliwych dla ludzi i zwierząt. Podczas jego stosowania należy chronić drogi oddechowe i oczy przed bezpośrednim oddziaływaniem preparatu. W razie potrzeby wezwać lekarza.

Miejsce kontaktu	Objawy	Pierwsza Pomoc
WDYCHANIE	Podrażnienie dróg oddechowych	Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli występuje kaszel i astmatyczne trudności z oddychaniem lub nie następuje szybka poprawa wezwać pomoc lekarską
SKÓRA	wysuszenie	Przemyć wodą
OCZY	swędzenie	Przemyć dużą ilością czystej wody, co najmniej 15 minut. Wezwać lekarza.
SPOŻYCIE	Może spowodować podrażnienie układu pokarmowego Nie prowokować wymiotów. Podać dużo wody lub mleka do picia. Wezwać lekarza.	Nie prowokować wymiotów. Podać dużo wody lub mleka do picia. Wezwać lekarza.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU I OPAKOWANIAM: Rozsypyany proszek zamieść. Umieścić w pojemniku. Chronić przed wilgocią i użyć ponownie. Odpad produktu przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia. Opakowania nadają się do recyklingu.

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować łącznie lub w obecności wodorotlenku wapnia i sodu.

OBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJĄ: Zapobiegać pyleniu się preparatu. Podczas pracy używać odzieży ochronnej, maski przeciwpyłowej, okularów i rękawic. Chronić przed dziećmi.

PRZECZYSZCZANIE: Przechowywać w suchych pomieszczeniach w oryginalnych opakowaniach w temperaturze pokojowej przez okres 2 lat od daty produkcji z dala od środków spożywczych i poza zasięgiem dzieci.

ILOŚĆ PRODUKTU W OPAKOWANIU: 10 kg, seria i data produkcji na opakowaniu,

Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji

Telefon kontaktowy do Biura DDD-1: 33-821-34-21, 668-152-393



VIRON[®] P

NAJLEPSZA DEZYNFEKCJA



DDD-1[®]
NAJLEPSZA DEZYNFEKCJA



VIRON[®] P

NAJLEPSZA DEZYNFEKCJA

ULEGA ROZKŁADOWI !!! BRAK BIOAKUMULACJI !!!

bezpieczny dla środowiska, zwierząt
oraz osób wykonujących zabiegi dezynfekcji

Preparat przebadany w
Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach
zgodnie z normą PN-EN 14675:2015
przeznaczoną dla środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze weterynaryjnym

Wieloskładnikowy preparat wiruso- oraz bakteriobójczy.

PRZEZNACZENIE

dezynfekcja jaj
dezynfekcja inkubatorów i klujników
maty dezynfekcyjne
dezynfekcja leżniz
dezynfekcja schronisk dla zwierząt
dezynfekcja pomieszczeń hodowlanych (dezynfekcja profilaktyczna i interwencyjna)
dezynfekcja rusztów oraz kanałów gnojowych
dezynfekcja wybiegów oraz miejsc przetrzymywania zwierząt
dezynfekcja środków transportu żywca

ZAŁECANE STĘŻENIE

od 0,5 % do 1%

STOSOWANIE

oprysk: 1 litr roztworu / 3-4 m² powierzchni (250ml do 333ml / 1m²)
zamgławianie: 1ml / 1 m³ (1L / 1000 m³)


MASA: 1kg, 5kg

TERMIN WAŻNOŚCI 36 miesięcy od daty produkcji

PRODUKT POLSKI

DDD-1[®]

ul. Hałcnowska 19; 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33-821-34-21




www.NajlepszaDezynfekcja.pl
www.SklepHodowcy.pl

FAM 30



NAJLEPSZA DEZYNFEKCJA



DDD-1[®]

NAJLEPSZA DEZYNFEKCJA



FAM 30



NAJLEPSZA DEZYNFEKCJA

**MOŻNA STOSOWAĆ w OBECNOŚCI ZWIERZĄT
NIE WYMAGA SPŁUKIWANIA
ULEGA BIODEGRADACJI**

**uniwersalny środek dezynfekcyjny
o właściwościach myjących na bazie jodu**

Wieloskładnikowy preparat biobójczy (bakterio-, grzybo- i wirusobójczy) na bazie aktywnego jodu o odczynie kwaśnym.

Zawiera jod aktywny 2,84%, niejonowy środek powierzchniowo czynny 22,5%, kwas siarkowy, kwas fosforowy.

PRZEZNACZENIE

do ogólnej dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich (1:100)

do dezynfekcji powietrza, w których przebywają zwierzęta (za wyjątkiem krów) (1:500)

do dezynfekcji sprzętów stosowanych i związanych z utrzymaniem zwierząt (1:20-1:600)

do mycia i dezynfekcji wyposażenia laboratoryjnego, narzędzi weterynaryjnych i zootechnicznych (1:20-1:600)

do mat i śluz dezynfekcyjnych (1:100-1:400)

do dezynfekcji jaj w wylęgarniach drobiu (1:600-1:1200)

ZAŁECANE STĘŻENIE

od 0,08 % do 5%

STOSOWANIE

oprysk: 1 litr roztworu / 3-4 m² powierzchni (250ml do 333ml / 1m²)

zamgławianie: 1ml / 1 m³ (1L / 1000 m³)

POJEMNOŚĆ: 1L, 5L, 25L


TERMIN WAŻNOŚCI 36 miesięcy od daty produkcji

PRODUKT BIOBÓJCZY nr pozwolenia PL/2019/0396-002-MR/BPF

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Evans Vanodine Europe

DDD-1[®]

**ul. Hałcnowska 19; 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33-821-34-21**



**www.NajlepszaDezynfekcja.pl
www.SklepHodowcy.pl**