

PTASZYŃCIEC PROGRAM ZWALCZANIA



www.ZwalczaniePtaszyńca.pl

OML – Out Mite Liquid

Preparat do mycia, konserwacji i zabezpieczenia klatek na fermach kurzych

OML - Out Mite-Liquid jest pieniącym, silnie skoncentrowanym środkiem do mycia wszelkich powierzchni na fermach niosek w systemie klatkowym, na fermach reprodukcyjnych i w chowie ściółkowym. Bezpieczny w stosowaniu – nie powoduje korozji, nie zawiera substancji toksycznych. Może być stosowany w gospodarstwach ekologicznych.

STOSOWANIE: Out Mite-Liquid przeznaczony jest do bezpośredniego oprysku na wszelkiego rodzaju powierzchni.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na powierzchnie trudno dostępne, ranty pod karmidłami, połączenia klatek. Oprysk należy wykonać od dołu ku górze, tak żeby kropla oprysku dotarła wszędzie. Po zakończeniu rzutu kurnik należy dokładnie umyć środkiem Out Mite Liquid, a w ostatnim zabiegu nanieść go w formie piany i pozostawić bez splukiwania do wyschnięcia.

DAWKOWANIE: Preparat stosuje się w rozcieńczeniu od 7-10% w oprysku niskociśnieniowym, drobnokroplistym bezpośrednio na owady. Zabiegi przeprowadzać co 6-7 dni. Długość cyklu zależy od temperatury na obiekcie. Jeżeli temperatura w obiekcie wynosi powyżej 25° C, oprysk należy wykonać częściej, co 5 dni.

ZABEZPIECZENIE SAMOCHODÓW PRZED PTASZYŃCEM DO TRANSPORTU DROBIU – INSTRUKCJA STOSOWANIA

PREPARATU OML: Roztworem 7-10% dokładnie opryskać lub zapianować (przy użyciu wytwornic piany) samochód (cała naczepa transportowa). Naniesiony roztwór pozostawić na powierzchni na czas 15-30 min. Następnie splukać dokładnie czystą wodą. Klatki (skrzynki) do transportu drobiu traktować identycznie.

ECO-STRIKE out mite

Preparat do opylania lub oprysku miejsc bytowania ptaszyńca

ECO-STRIKE out mite jest produktem przeznaczonym do kontroli ptaszyńca na fermach drobiu wielkotowarowych, ekologicznych oraz przy przydomowych hodowlach drobiu.

SKŁAD: ziemia krzemionkowa, montmorylonit

STOSOWANIE: Eco-Strike наносimy przy użyciu opylaczy (maszyn do rozpylania proszku) lub przy użyciu opryskiwaczy (np. urządzenia do bielania)

DAWKOWANIE: Opylenie: dawka od 1g do 7g / noskę (dawkę należy ustalić indywidualnie na podstawie ilości występującego ptaszyńca). Zabiegi powtarzać w odstępach od 1 do 2 miesięcy.

Oprysk: 3 do 5 części wody dodać 1 część Eco-Strike'a. Dobrze wymieszać. Oprysk wykonać tzw. grubą kroplą w ilości 150ml / 1m² (na baterię o wymiarach 100 m długości i 3 kondygnacjach zużywamy 20 kg Eco-Strike'a w ilości 100 litrów wody, baterie o innych wymiarach przeliczyć proporcjonalnie).

UWAGA: roztwór zachowuje stabilność do 2 godzin, po tym czasie może nastąpić sedymentacja.

ZALECENIA:

W trakcie opylania nieznacznie zmniejszyć wentylację, kontrolując wskazania temperatury na sterownikach wentylacji. UWAGA: zawsze w trakcie zabiegu utrzymywać minimum wentylacji.

Oprysk nie wymaga zmniejszania parametrów wentylacji. Eco-Strike stosować po zbiorze jaj.

WAŻNE: Aby skutecznie ograniczyć populację ptaszyńca na fermie należy obie powyższe metody zintegrować, stosując w pierwszej kolejności opryski preparatem OML (co najmniej 2 razy) a następnie w odstępie min. 7 dni od oprysku wykonać opylenie preparatem Eco-Strike out mite.

